

Information

Test de tolérance au glucose/au lactose


Chère patiente, cher patient,

Si vous voulez effectuer un test de tolérance au glucose/lactose dans notre laboratoire, nous vous prions de prendre en considération les informations suivantes:

- Ce test n'est réalisée qu'après accord préalable d'un rendez-vous. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne sur notre site Internet www.labors.at sous le point de menu „Termin buchen“ ou par téléphone au numéro 01/260 53-0.
- En cas de difficultés de compréhension de l'allemand, nous vous prions de vous faire accompagner pour la traduction.
- Nous ne pouvons faire le test qu'à partir d'un poids de 45 kg.
- Venez à jeun. Cependant, vous pouvez boire de l'eau et du thé non sucré.
- Si une analyse d'urine est nécessaire, veuillez donner votre prélèvement avant d'effectuer le test de tolérance au glucose/lactose.
- Le test de tolérance au glucose/lactose dure deux heures et demie au maximum.
- Pendant la durée de l'examen, il vous faut rester dans les locaux du laboratoire. Dans le cas contraire, vous devrez signer un formulaire de décharge. Si vous quittez le laboratoire sans nous prévenir, le test sera annulé.
- Il n'est pas permis de manger ou d'allaiter pendant la durée du test ; il est cependant possible de boire de l'eau à petites gorgées (max. 250 ml).

Déroulement de l'examen:

- Dans un premier temps, nous effectuons une ponction sanguine au bout du doigt. Le taux de sucre obtenu déterminera s'il est possible ou non d'effectuer le test de tolérance au glucose/lactose.
- Dans un second temps, nous procéderons à une prise de sang veineuse.
- Ensuite, vous devrez boire une solution sucrée dans un laps de temps de 5 minutes maximum.
Pour les femmes enceintes, nous effectuerons une ponction veineuse après 60 min. et après 120 min.
- Pour les autres, nous effectuerons une deuxième mesure par ponction veineuse après 120 min.
- Pour le test de tolérance au lactose, nous effectuerons une ponction veineuse après 30, 60, 90 et 120 min.



Note: nous vous prions de nous informer immédiatement en cas de nausée et/ou de vomissement pendant la durée du test.